

RM CON MEZZO DI CONTRASTO

L'esecuzione della Risonanza Magnetica può prevedere l'impiego del Mezzo di contrasto, per evitare controindicazioni **si richiede l'esecuzione preliminare di Creatinina con Filtrato Glomerale (eGFR), non antecedente di 3 mesi, al fine di escludere insufficienza renale.** Tale esame dovrà essere esibito al personale dell'Ospedale Koelliker il giorno dell'esame.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

INFORMATIVA IN MERITO AL RISCHIO DI REAZIONE AVVERSA

A MEZZI DI CONTRASTO

In riferimento al documento di consenso SIRM-SIAAIC, Società italiane di radiologia e di allergologia approvato in data 5 dicembre 2017 e recepito dalle società congiunte suddette in data 12 aprile 2018, sulla base della più recente letteratura scientifica e delle Linee Guida Internazionali si precisa quanto segue:

1. È stata confermata la mancata efficacia protettiva della profilassi antiallergica nella prevenzione delle reazioni avverse al Mezzo di Contrasto, per cui **non è più indicata la premedicazione nei pazienti con allergie (ad es: acari, cibi, farmaci, pollini, metalli ecc.)**
2. **I pazienti che hanno avuto in passato un episodio di grave reazione allergica al Mezzo di contrasto (shock anafilattico o grave crisi respiratoria) vengono inviati al medico curante con l'indicazione ad eseguire una consulenza allergologica urgente corredata di test cutanei per i singoli Mezzi di Contrasto noti.** Sulla base dei risultati riscontrati viene quindi valutata la reale necessità di sottoporre il paziente ad esame con Mezzo di Contrasto, e se necessario si eseguirà l'esame utilizzando un Mezzo di Contrasto chimicamente diverso.
3. Nei pazienti con qualsivoglia reazione allergica, in atto al momento dell'esame, si soprassiede dall'infusione del Mezzo di Contrasto, fino a completa risoluzione della sintomatologia, documentata dal medico curante.

Si ricorda che è necessario portare tutti gli esami precedenti e di avvisare in caso di rinuncia.